

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS



LUSTREXTRA 68,75 SC

FUNGICIDA –CARBAMATO, BENZAMIDA
PROPAMOCARB HYDROCHLORIDE, FLUOPICOLIDE

ATENCIÓN
ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,13 g/ml a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

"NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS"



USO AGRONÓMICO: LUSTRE XTRA 68,75 SC es un fungicida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: LUSTRE XTRA 68,75 SC es un fungicida sistémico, translaminar, protectante, preventivo y curativo. Se absorbe a través del follaje y las raíces.

Propamocarb Hydrochloride inhibe la síntesis de lípidos causando alteración en la formación de la pared celular de los hongos. Inhibe así el crecimiento del micelio, la producción y la germinación de las esporas. **Fluopicolide** provoca la deslocalización de proteínas tipo espectrina causando desequilibrio entre la membrana plasmática y el citoesqueleto de los hongos.

EQUIPO DE APLICACIÓN: LUSTRE XTRA 68,75 SC puede aplicarse con equipo manual terrestre, bombas de mochila o adaptado a la fuerza del tractor. Use boquillas de cono. Antes de usar el equipo de aspersión revise que esté en buen estado de funcionamiento, libre de fugas y calibrado. Después de la aplicación lave el equipo de aplicación, deje secar y guarde. Utilice el equipo de protección personal. No comer, beber o fumar durante la aplicación del producto.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque del equipo hasta la mitad con agua limpia, ajuste el pH 5-7; añadir la dosis recomendada del producto, agitar, observe la formación de una mezcla estable y homogénea y termine de llenar con agua limpia el volumen del tanque de aplicación, agitar. Use la mezcla el mismo día de la preparación. El equipo y los utensilios (cubetas, paletas, dosificadores, etc.) usados durante la preparación de la mezcla, deben ser lavados después de cada jornada de trabajo; no contaminar fuentes de agua. Recuerde brindar mantenimiento permanente al equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

PARA GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA:

CULTIVOS:	ENFERMEDADES	DOSIS
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i> Chile <i>Capsicum annuum</i> Berenjena <i>Solanum melongena</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Marchitez Vascular Fusarium oxysporum Mildiu <i>Peronospora spp.</i> <i>Pseudoperonospora spp</i> Complejo del mal del tallo <i>Rhizoctonia spp.</i> , Tizón sureño Sclerotium rolfsii <i>Phytophthora Phytophthora spp.</i> , <i>Pythium Pythium spp.</i> , <i>Sclerotinia Sclerotinia spp.</i>	En riego por goteo o drench: 1,5-2,0 L/ha 1,05-1,4 L/mz
Melón <i>Cucumis melo</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i> Calabazas <i>Cucurbita sp</i> Chayote <i>Sechium edule</i>	Tizón tardío Phytophthora spp. Alternaria <i>Alternaria spp.</i> Mancha foliar gris <i>Septoria spp.</i> <i>Cladosporium Cladosporium cucumerinum</i> Mildiu <i>Bremia lactucae</i>	En aplicación Foliar: 1.0-1.5 L/ha 0,7-1,05 L/mz

INTERVALO DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de las enfermedades. En aplicación foliar: se recomienda aplicar en un intervalo de 7 días. No aplicar más de 4 veces por ciclo de cultivo, alterne con otros productos con diferente modo de acción.

En aplicación de riego por goteo o drench: se recomienda hacer una aplicación después del trasplante y repetir el tratamiento en un intervalo de 14-21 días, alterne con otros productos con diferente modo de acción.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Tomate, Chile, Berenjena, Pepino, Calabazas, Chayote: 7 días.

Melón, Sandía: 14 días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere a que la aplicación haya secado, aproximadamente 12 horas, si es necesario ingresar previamente utilice el equipo completo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: El producto no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos recomendados. Evite la deriva a cultivos aledaños sensibles.

COMPATIBILIDAD: El producto es compatible con otros productos plaguicidas de uso común. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala previo a su aplicación en mezclas con otros productos. El producto no es compatible con productos de fuerte reacción alcalina.


PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Se recomienda usar traje completo impermeable con capucha. Utilice overol, sombrero, gafas, botas y guantes resistentes a químicos, mascarilla aprobada por NIOSH. Realice triple enjuague a envases. Realice la mezcla sobre camas biológicas.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los plaguicidas en contacto con otros insumos fitosanitarios, tales como: fertilizantes y semillas. Almacene y transporte este producto bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Transporte y almacene el producto en su envase original, etiquetado con su panfleto y cerrado herméticamente. Evite fuentes de ignición, las temperaturas elevadas y la luz solar directa. El producto es inflamable, es explosivo, no es corrosivo u oxidante. El producto no es compatible con productos de fuerte reacción alcalina.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA, APLICACIÓN O COLOCACION: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Podría observarse náuseas, mareos, vómitos, dolor de cabeza, calambres abdominales, malestar general. Letargo, ataxia, convulsiones.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAIS	INSTITUCION	TELEFONOS
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial	(501) 232-0735
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	(502) 2251-3560 (502) 2232-0735
EL SALVADOR	Centro de Información Toxicológica Hospital Rosales	(503) 2231-9262
HONDURAS	Hospital Escuela	(504) 232-6105
NICARAGUA	Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento Toxicológico	(505) 2289-4700 ext. 1294 Cel. (505) 8755-0983
COSTA RICA	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	(506) 2223-1028
PANAMA	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	(507) 523-4948
REPUBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-2913/6922

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS

Fluopicolida es persistente en el suelo y en el agua. Propamocarb clorhidrato es moderadamente persistente en el suelo y persistente en el agua. Recoja los derrames con un material adsorbente (arena, tierra o aserrín) y dépositelos en un recipiente, para evitar contaminación por derrames haga uso de camas biológicas. Realice triple enjuague de

envases, perforo estos y llévelos al centro de acopio. El producto no es compatible con productos reguladores del crecimiento. El producto no es inflamable, no es explosivo, no es corrosivo.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO. ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Después de vaciar todo el producto del envase, enjuáguelo por lo menos tres veces y vierta el líquido en el tanque de aplicación. Perfore los envases vacíos y elimine los embalajes, envases, derrames y demás desechos de acuerdo con lo estipulado por la autoridad competente en la materia. En caso de remanentes, aplíquelos en los bordes del cultivo. No tire los residuos por el drenaje. Elimine los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles, trátelos como residuos peligrosos.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA: Garantizamos que el contenido de este envase es conforme a la composición química que indica la etiqueta, pero no pudiendo controlar el almacenamiento y otros factores inherentes a su uso, la empresa fabricante y formuladora no se hace responsable de los resultados que se obtengan. El consumidor asume los riesgos de los daños causados y que su buen uso será exclusivo de acuerdo con las recomendaciones de utilización que se indican en el panfleto.

FABRICANTE Y FORMULADOR:

Bengbu Bioagriland FaithChem Co., Ltd

DOMICILIO LEGAL: No. 23, Feihezong Road, Mohekou Industrial Park,

Huashang District, Bengbu City, Anhui Province, China

Tel: 025-86304886/ 86304885

E-mail: marketing@bioagriland.com

IMPORTADOR:

PAÍS	Y	NÚMERO DE REGISTRO
PANAMA		Nº 11321
HONDURAS		
NICARAGUA		
GUATEMALA		
EL SALVADOR		