

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO,  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

**AGROBEATS**  
Grow the Field More



**ARTHUR XTRA 26 SL**

HERBICIDA – FENOXIACÉTICO, PIRIDINA  
2,4-D, AMINOPYRALID



**ATENCIÓN**  
**ANTÍDOTO: NO TIENE**  
DENSIDAD: 1,00 g/ml a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE  
CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

“NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE LOS NIÑOS,  
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES,  
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO: ARTHUR XTRA 26 SL es un herbicida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: ARTHUR XTRA 26 SL es un herbicida  
sistémico usado para el control de malezas de hoja ancha herbáceas,  
semi-leñosas y leñosas en pastos que combina dos ingredientes activos:  
2,4-D y Aminopirald. 2,4-D es un herbicida hormonal de acción  
sistémico, post emergente, usado para el control de malezas de hoja  
ancha. Es absorbido por las hojas y trasladado a la raíz y tallos. Produce  
grandes alteraciones del metabolismo que induce a la muerte de la  
planta. Aminopirald es un herbicida sistémico postemergente que es  
absorbido por las hojas y raíces y con acción residual.

EQUIPO DE APLICACIÓN: ARTHUR XTRA 26 SL, Previo a su aplicación,  
asegurar que el equipo de aplicación (bomba de espalda o mecánica)  
esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Se puede aplicar por vía  
terrestre usando un volumen de 200 a 400 litros de mezcla/ha, con  
boquilla No. 8002 SS., aplicado mediante aspersión directa a las malezas.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llene el tanque del equipo  
hasta la mitad con agua limpia, ajuste el pH 5-7; añadir la dosis  
recomendada del producto, agitar, observe la formación de una mezcla  
estable y homogénea y termine de llenar con agua limpia el volumen  
del tanque de aplicación, agitar. Use la mezcla el mismo día de la  
preparación. El equipo y los utensilios (cubetas, paletas, dosificadores,  
etc.) usados durante la preparación de la mezcla, deben ser lavados  
después de cada jornada de trabajo; no contaminar fuentes de agua.  
Recuerde brindar mantenimiento permanente al equipo de aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

PARA GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA  
RICA, PANAMA Y REPUBLICA DOMINICANA:

CULTIVOS	MALEZAS A CONTROLAR:	DOSIS RECOMENDADA:
PASTOS Y POTREROS	Escobillos ( <i>Sida acuta</i> ), Escoba Blanca ( <i>Melochia parviflora</i> ), Dormilona ( <i>Mimosa pudica</i> ), Zarza ( <i>Mimosa pigra</i> ), Abejon ( <i>Cassia tora</i> ), Cornizuelo ( <i>Acacia collinsii</i> ), Viverana ( <i>Asclepsia surassavica</i> )	1,5-3,0 litros /ha.
Maíz	Gigantón <i>Tithonia tubiformis</i> Fresadilla <i>Aldama dentata</i> Golondrina <i>Euphorbia heterophylla</i> Quesillo <i>Anoda cristata</i> Gusanillo <i>Acalipha setosa</i> Rábano silvestre <i>Raphanus raphanistrum</i> Tomatillo pegajoso <i>Physalis foetens</i> Tomatillo <i>Physalis philadelphica</i> Aceitilla <i>Bidens oderata</i> Quelite cenizo <i>Chenopodium album</i> Quesillo <i>Malva parviflora</i> Acahual <i>Simsia amplexicaulis</i> Nabo silvestre <i>Brassica campestris</i> Agritos <i>Oxalis latifolia</i> Verdolaga <i>Portulaca oleracea</i> Quelite <i>Amaranthus hybridus</i>	1,5-3,0 litros /ha.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Pastos y Potreros: Se recomienda una sola aplicación por ciclo de cultivo  
en post emergencia en potreros.

Maíz: Aplicar cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo.  
Aplique cuando la maleza tenga menos de 15 cm de altura y el cultivo  
no tenga más de 8 hojas.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

Pastos y potreros: 7 días. Maíz: 30 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

24 horas para ingresar al cultivo. Permitir el ingreso de los animales 14  
días después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y en los cultivos recomendados. Es fitotóxico  
a todos los cultivos de hoja ancha.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de los herbicidas. Incompatible con  
productos altamente oxidantes, de fuerte reacción alcalina, derivados  
del petróleo y aceite quemado. Sin embargo, se recomienda hacer una  
prueba de compatibilidad previa a la mezcla y aplicación final.


PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el manejo, mezcla, aplicación y lavado del equipo de aplicación,  
utilice equipo de protección completo: sombrero, gafas protectoras,  
mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación  
y de protección después de cada jornada de trabajo. No lave la ropa de  
protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo  
con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes,  
medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los  
plaguicidas en contacto con otros insumos fitosanitarios, tales como:  
fertilizantes, semillas. Almacene y transporte este producto bajo llave  
en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor. Conserve el  
producto en su envase original, etiquetado, con su panfleto y cerrado  
herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA, APLICACIÓN O COLOCACION: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Por contacto con los ojos puede causar severa irritación con daño de la córnea, que puede resultar en debilitamiento permanente de la visión, ceguera y quema química. Por contacto con la piel puede causar irritación, con enrojecimiento localizado. Puede causar sequedad y escama. Por ingestión puede causar daño del tracto gastrointestinal.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**EN CASO DE INGESTIÓN:** no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** No tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático y fortalecimiento general.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

PAIS	INSTITUCION	TELEFONOS
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial	(501) 232-0735
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	(502) 2251-3560 (502) 2232-0735
EL SALVADOR	Centro de Información Toxicológica Hospital Rosales	(503) 2231-9262
HONDURAS	Hospital Escuela	(504) 232-6105
NICARAGUA	Centro de Información, Vigilancia y Asesoramiento Toxicológico	(505) 2289-4700 ext. 1294 Cel. (505) 8755-0983
COSTA RICA	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	(506) 2223-1028
PANAMA	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	(507) 523-4948
REPUBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello	(809) 684-3478/3672 (809) 681-2913/6922

**PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



TÓXICO PARA EL GANADO



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS

2,4-D no es persistente en el suelo, pero si en el agua. Aminopirialid es moderadamente persistente en el suelo y persistente en el agua. Recoja los derrames con un material adsorbente (arena, tierra o aserrín) y dépositelos en un recipiente, para evitar contaminación por derrames haga uso de camias biológicas. Realice triple enjuague de envases, perfore estos y llévelos al centro de acopio. El producto no es inflamable, no es explosivo, ni corrosivo.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

**MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:**

Después de vaciar todo el producto del envase, enjuáguelo por lo menos tres veces y vierta el líquido en el tanque de aplicación. Perfore los envases vacíos y elimine los embalajes, empaques, derrames y demás desechos de acuerdo con lo estipulado por la autoridad competente en la materia. En caso de remanentes, aplíquelos en los bordes del cultivo. No tire los residuos por el drenaje. Elimine los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles, trátelos como residuos peligrosos.



**\*EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE\***

**AVISO DE GARANTÍA:** Garantizamos que el contenido de este envase es conforme a la composición química que indica la etiqueta, pero no pudiendo controlar el almacenamiento y otros factores inherentes a su uso, la empresa fabricante y formuladora no se hace responsable de los resultados que se obtengan. El consumidor asume los riesgos de los daños causados y que su buen uso será exclusivo de acuerdo con las recomendaciones de utilización que se indican en el panfleto.

**FORMULADOR:**

**Bengbu Bioagriland FaithChem Co., Ltd**  
No. 23, Feihezhong Road, Mohekou Industrial Park,  
Huaishang District, Bengbu City, Anhui Province, China  
Tel: 025-86304886/ 86304885  
E-mail: [marketing@bioagriland.com](mailto:marketing@bioagriland.com)

**IMPORTADOR:**

**AGROCENTRO PANAMA S.A.**  
Barriada el Rosario, Calle Avenida Arnulfo Escalona Rios  
(circunvalacion), Corregimiento de Llano Bonito,  
Distrito de Chitre, Provincia de Herrera  
Telefonos de Oficina: +507 996-3280 / Celular +507 6980-9771

PAÍS	Y	NÚMERO DE REGISTRO
PANAMA		N °11143
HONDURAS		
NICARAGUA		
GUATEMALA		
EL SALVADOR		